



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
سازمان امنیت و فزکی
مرکز شورده آنلاین

آمار جهانی ایدز

روز جهانی ایدز ۱۰ آذر ۱۴۰۲، ۱ دسامبر ۲۰۲۳

۲۰۲۳ WORLD AIDS DAY

دسترسی به درمان اچ آی وی - تا پایان سال ۲۰۲۲، ۲۹/۸ میلیون نفر مبتلا به اچ آی وی (۷۶ درصد از کل افراد مبتلا به اچ آی وی) به درمان ضد رتروویروسی (ART) در سراسر جهان دسترسی داشتند. دسترسی به درمان اچ آی وی کلیدی برای تلاش جهانی برای پایان دادن به ایدز به عنوان یک تهدید برای سلامت عمومی است. افراد مبتلا به اچ آی وی که از وضعیت خود آگاه هستند، درمان ضد رتروویروسی را بر اساس دستورالعمل تجویز شده می‌گیرند و ویروسی که در بدنشان وجود دارد را کنترل می‌کنند، می‌توانند زندگی بلندمدت و سالمی داشته باشند و از طریق رابطه جنسی به شریکان منفی اچ آی وی خود ویروس را منتقل نکنند.

این گاهی به عنوان،
untransmittable=undetectable
"غیرقابل کشف=غیرقابل انتقال" یا **U=U** اشاره می‌شود. اهداف جهانی برای سال ۲۰۲۵ شامل دریافت درمان ضد رتروویروسی پایدار توسط ۹۵ درصد افراد مبتلا به اچ آی وی تشخیص داده شده و رسیدن به حفظ کنترل ویروسی اچ آی وی توسط ۹۵ درصد از افرادی که در حال درمان هستند، می‌شود.

همه گیری جهانی اچ آی وی و ایدز

اج آی وی، ویروسی که منجر به بیماری ایدز می‌شود، یکی از جدی‌ترین چالش‌های بهداشت عمومی در جهان است. اما تعهد جهانی برای متوقف کردن انتقال‌های جدید اچ آی وی و اطمینان از اینکه همه افراد مبتلا به اچ آی وی به درمان آن دسترسی داشته باشند، وجود دارد. آخرین آمارهای اچ آی وی در سراسر جهان با توجه به اعلام سازمان جهانی برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز شامل:

تعداد افراد مبتلا به اچ آی وی - در سال ۲۰۲۲ تقریباً ۳۹ میلیون نفر در سراسر جهان مبتلا به اچ آی وی بودند. از این تعداد ۳۷/۵ میلیون نفر بزرگسال و ۱/۵ میلیون نفر کودک (کمتر از ۱۵ سال) بودند. علاوه بر این، ۵۳٪ مبتلایان، زنان و دختران بودند.

سرایت‌های جدید اچ آی وی - تقریباً ۱/۳ میلیون نفر در سراسر جهان در سال ۲۰۲۲ اچ آی وی گرفتند، که نشان از کاهش ۳۸ درصدی در سرایت‌های جدید اچ آی وی از سال ۲۰۱۰ و ۵۹ درصد از زمان اوج آن در سال ۱۹۹۵ دارد. سرایت‌های جدید اچ آی وی یا "وقوع اچ آی وی" به تعداد تخمین زده شده افرادی اشاره دارد که در طول یک دوره مشخص مانند یک سال اچ آی وی را به تازگی به دست می‌آورند، که با تعداد افراد تشخیص داده شده با اچ آی وی در طول یک سال متفاوت است. (بعضی از افراد ممکن است اچ آی وی داشته باشند اما از آن اطلاع نداشته باشند). زنان و دختران در سال ۲۰۲۲ مسئول ۶۴ درصد از تمام سرایات‌های جدید اچ آی وی بودند.

آزمایش اچ آی وی و آگاهی از وضعیت اچ آی وی - تقریباً ۸۶ درصد افراد مبتلا به اچ آی وی در سراسر جهان در سال ۲۰۲۲ از وضعیت اچ آی وی خود آگاه بودند. ۱۴ درصد باقی‌مانده (حدود ۵/۵ میلیون نفر) از این افراد از این موضوع آگاه نبودند و هم چنان به خدمات آزمایش اچ آی وی نیاز داشتند. آزمایش اچ آی وی دروازه اساسی برای پیشگیری، درمان، مراقبت و خدمات حمایتی اچ آی وی است. هدف جهانی سازمان ملل متحد در زمینه ایدز، آگاهی از وضعیت اچ آی وی، ۹۵ درصد از مبتلایان تا سال ۲۰۲۵ است.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
سازمان امنیت و فزکی
مرکز شورده آموزشی

آمار جهانی ایدز

روز جهانی ایدز ۱۰ آذر ۱۴۰۲، ۱ دسامبر ۲۰۲۳

۲۰۲۳ WORLD AIDS DAY

پیوستگی مراقبت از اچ آی وی

اصطلاح پیوستگی مراقبت از اچ آی وی به دنباله‌ی مراحلی اشاره دارد که یک فرد مبتلا به اچ آی وی از زمان تشخیص تا دریافت درمان تا زمانی که بار ویروسی او به سطح غیرقابل شناسایی کاهش می‌یابد، طی می‌کند. هر مرحله در این زنجیره با ارزیابی تعداد افرادی که به آن مرحله رسیده‌اند مشخص می‌شود. این مراحل شامل مرحله تشخیص اچ آی وی، ارتباط با مراقبت‌های پزشکی، شروع درمان ضد رتروویروسی (ART)، رعایت رژیم درمانی و در نهایت کاهش بار ویروسی اچ آی وی به سطح غیرقابل شناسایی در خون می‌باشد. طبق گزارشات سازمان جهانی برنامه مشترک ملل متعدد در زمینه ایدز در سال ۲۰۲۲، در میان تمام افراد مبتلا به اچ آی وی در سراسر جهان:

- ۷۶ درصد از افراد آگاهی داشتند که مبتلا به اچ آی وی هستند.
- ۷۶ درصد از آن‌ها به درمان ضد رتروویروسی دسترسی داشتند.
- ۷۱ درصد از آن‌ها بار ویروسی خود را به سطح غیرقابل شناسایی کاهش داده بودند.

چالش‌ها و پیشرفت‌ها

با وجود پیشرفت‌های به دست آمده در فهم علمی ما از اچ آی وی و پیشگیری و درمان آن، و همچنین سال‌ها تلاش قابل توجه انجام‌شده توسط جوامع بهداشت جهانی و سازمان‌های دولتی و مدنی بر جسته، هنوز هم بسیاری از افراد مبتلا به اچ آی وی یا در معرض خطر ابتلا به آن، به پیشگیری، مراقبت و درمان دسترسی ندارند و هنوز هم درمانی برای این بیماری وجود ندارد. علاوه بر این، ویروس اچ آی وی نه تنها بر سلامت افراد تأثیر می‌گذارد، بلکه بر خانواده‌ها، جوامع و توسعه و رشد اقتصادی کشورها هم تأثیر می‌گذارد. بسیاری از کشورهایی که بیشترین ضربه را از اچ آی وی متحمل می‌شوند، همچنین از بیماری‌های عفونی دیگر، نامنی غذایی و مشکلات جدی دیگر رنج می‌برند.

با وجود این چالش‌ها، پیروزی‌ها و نشانه‌های امیدبخشی وجود دارد. به خصوص در دهه گذشته تلاش‌های جهانی جدیدی برای مقابله با اپیدمی انجام شده است. تعداد افرادی که بهطور تازه اچ آی وی گرفته اند در طول سال‌ها کاهش یافته است. علاوه بر این، تعداد افراد مبتلا به اچ آی وی که در کشورهای فقیر در دهه گذشته درمان دریافت کرده‌اند به طور چشمگیری افزایش یافته است و پیشرفت چشمگیری در جلوگیری از انتقال پیش از زایمان اچ آی وی و زنده نگهداشت زنان باردار شده است.

با این حال، با وجود دسترسی گستردگی به ابزار و روش‌های موثر در پیشگیری از اچ آی وی و مقیاس بزرگ درمان این بیماری در سال‌های اخیر، سازمان ملل هشدار داده است که پیشرفت در کاهش ابتلا به اچ آی وی، افزایش دسترسی به درمان و پایان دادن به مرگ‌های مرتبط با ایدز نابرابر بوده است و بسیاری از افراد و جمیعت‌های آسیب‌پذیر نادیده گرفته شده‌اند. تباہی و تبعیض مرتبط با اچ آی وی، همراه با نابرابری‌ها و مقتضیات اجتماعی دیگر، به عنوان موانع اصلی شناخته شده‌اند و پاسخ ما به اچ آی وی/ایdz در سراسر جهان ممکن است بدون تعهد و مشارکت‌های قوی، در معرض خطر قرار بگیرد.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
سازمان اثرباره‌های پزشکی
مرکز شورده‌ای انجمنی


آمار جهانی ایدز

روز جهانی ایدز ۱۰ آذر ۱۴۰۲، ۱ دسامبر ۲۰۲۳

۲۰۲۳ WORLD AIDS DAY

تأثیر منطقه‌ای

برخی مناطق جهان به طور نامناسبی توسط ویروس اچ آی وی تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. در سال ۲۰۲۲، ۲۰/۸ میلیون نفر مبتلا به اچ آی وی در آفریقای شرقی و جنوبی، ۴/۸ میلیون نفر در آفریقای غربی و مرکزی، ۶/۵ میلیون نفر در آسیا و اقیانوس آرام و ۲/۳ میلیون نفر در غرب و مرکز اروپا و شمال آمریکا وجود داشتند.



انتقال از مادر به فرزند

در سال ۲۰۲۲، به طور جهانی، ۸۲ درصد از زنان باردار مبتلا به اچ آی وی به درمان ضد رتروویروسی دسترسی داشتند تا از انتقال ویروس اچ آی وی به نوزادانشان در طول دوران بارداری و زایمان جلوگیری کنند و از سلامتی خود نیز مراقبت کنند.

مرگ‌های مرتبط با ایدز

مرگ‌های مرتبط با ایدز از اوچ خود در سال ۲۰۰۴ تا کنون به میزان ۶۹ درصد کاهش یافته است. در سال ۲۰۲۲، حدود ۶۳۰,۰۰۰ نفر به دلیل بیماری‌های مرتبط با ایدز در سراسر جهان درگذشته‌اند، در مقایسه با ۲ میلیون نفر در سال ۲۰۰۴ و ۱/۳ میلیون نفر در سال ۲۰۱۰.

تهیه کنندگان

تهیه و ترجمه:

نازنین فاطمه میرزاخانی دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران

گرافیک و دیزاین:

علی محمودی دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران

آدرس مراکز رائے دهنده خدمت تشخیص اچ آی وی

<https://icdc.behdasht.gov.ir>